

注射化療藥物注意事項 (Lipo-doxorubicin)



阮綜合醫院
阮綜合醫療社團法人
YUAN'S GENERAL HOSPITAL

2023/02 審閱

一、化學藥物治療：

利用口服或注射化學藥物來摧毀或抑制癌細胞的治療方式。

二、藥物簡介：

此藥品可以抑制癌細胞生長，為深紅色溶液，由特殊微脂體包覆藥物，而降低藥物對正常組織之損害，進而減少副作用。



三、常見的注射反應：

※手足症候群：手腳可能有感覺異常、發紅、疼痛、脫皮屑、起水泡、潰瘍



※心臟毒性：使用此藥治療期間要定期監測心電圖

※骨髓抑制：骨髓抑制大多為輕到中度，可回復，須定期監測血球數

※口腔黏膜炎

四、注意事項：

1. 每次給藥時，冰敷手、足部位，將手、腳浸浴在冷水中浸泡、洗澡或游泳），盡量保持手腳涼爽。
2. 避免給藥前 24/小時及給藥後的 3~5 天內接觸熱源或熱水，例如：不可洗熱水澡、泡溫泉。
3. 保持手、腳可自由活動，不要穿過緊的襪子與鞋子或戴太緊的手套。
4. 出門時盡量撐傘或置身於陰涼處。
5. 避免劇烈運動導致手腳皮膚受傷。
6. 多喝開水、避免刺激食物。口腔潰爛及疼痛，可攝取涼而軟，不帶酸味的食物。
7. 改用軟毛牙刷，於每次吃完東西後立即漱口，並最好每 2-6 小時，漱一次口。
8. 疼痛時及給藥期間可就口含冰塊，有預防或減輕嘴破的效果。



參考資料：

癌症護理學 4 版、癌症化學治療護理二版、力得微脂體注射劑藥物仿單、阮綜合醫院藥品辨識系統

圖片出處：<https://lurl.cc/GWUe3M>

製作單位：護理部 8B 護理站

諮詢電話：07-3351121 轉 2874