



# 手術前該如何服用 抗血栓藥品？



抗血小板藥品及抗凝血藥品（統稱抗血栓藥品）經醫師指示能夠用來預防血液中血塊的形成，減少缺血性腦中風、肺栓塞、深部靜脈栓塞或心肌梗塞的發生，但壞處可能導致出血延長，服藥的個案預接受手術時應與手術醫師共同討論術前是否該停藥，或與原先開藥醫師進行討論

1.先評估栓塞和出血風險，再決定停藥與否； 2.出血風險係指術後2天內大出血的比率

	低出血風險 (<2%)	高出血風險 (>2%)
術式	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆<u>顏面頭頸部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□拔牙(≥3顆)/非複雜性根管治療</li> <li>□口腔良性腫瘤手術□白內障手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>皮膚部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□表皮清創手術/表皮縫合手術</li> <li>□膿瘍引流術/腋窩淋巴清除手術</li> <li>□皮膚切片/皮膚癌切除</li> </ul> </li> <li>◆<u>心血管部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□節律器/去顫器置入和設備替換</li> </ul> </li> <li>◆<u>消化道/直腸系統部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□膽囊/闌尾/痔瘡手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>婦科部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□子宮擴括術□腹腔鏡子宮切除術</li> </ul> </li> <li>◆<u>骨科部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□關節鏡□肩部/足部/手部手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>泌尿部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□陰囊積水修補□腹部疝氣手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>鏡檢類</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□診斷性內視鏡/診斷性大腸鏡/診斷性支氣管鏡(含切片)</li> </ul> </li> <li>◆<u>導管置入類</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□肋膜穿刺/腹膜穿刺/植入性週邊靜脈導管/暫性透析導管植入</li> </ul> </li> <li>◆<u>切片類</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□甲狀腺/乳房/淋巴結/胰臟/攝護腺/膀胱切片</li> </ul> </li> <li>◆<u>其他(經由醫師判斷)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□_____</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆<u>麻醉類</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□脊椎/硬膜上麻醉□&gt;45分鐘之大型手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>顏面頭頸部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□牙重建手術□鼻竇手術</li> <li>□甲狀腺切除 □大型整型重建手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>心血管部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□心導管□心臟瓣膜置換術</li> <li>□靜脈曲張治療 □其他大型血管手術</li> <li>□頸動脈繞道/冠狀動脈/周邊血管繞道術</li> </ul> </li> <li>◆<u>胸腔部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□胸腺切除術</li> <li>□肺葉/楔狀/肺節/肺部份切除術</li> </ul> </li> <li>◆<u>消化道系統部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□食道靜脈曲張結紮</li> <li>□腹腔鏡手術 □肝/脾/腎臟/腸切除手術</li> <li>□膽/胰括約肌切開術 □造口術(胃/空腸)</li> <li>□主要腹部(含腹主動脈瘤)手術 □食道/腸支架</li> </ul> </li> <li>◆<u>婦科部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□子宮切除</li> </ul> </li> <li>◆<u>骨科部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□關節置換□脊椎手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>泌尿部位</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□震波碎石□經尿道攝護腺切除術</li> </ul> </li> <li>◆<u>鏡檢類</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□內視鏡息肉切除術(&gt;1cm) □內視鏡止血術</li> </ul> </li> <li>◆<u>導管置入類</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□胸管置放/動脈穿刺/脊椎穿刺</li> </ul> </li> <li>◆<u>切片類</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□腎臟/膀胱/脾臟切片</li> <li>□經皮肝/腎切片 □支氣管鏡切片</li> </ul> </li> <li>◆<u>癌症</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□頭頸癌/乳癌/腹部癌症/泌尿道或生殖器癌症切除手術</li> </ul> </li> <li>◆<u>其他(經由醫師判斷)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>□_____</li> </ul> </li> </ul>

類別	藥物學名	商品名	停藥建議 (至少天數)		
抗 血 小 板 藥 品	Acetylsalicylic acid	Bokey	7~10 天		
		Aspirin			
	Cilostazol	Pletaal	2~3 天		
	Ticlopidine	Menchuan	10~14 天		
	Ticagrelor	Brilinta	5~7 天		
	Clopidogrel	Plavix	5~7 天		
	Prasugrel	Efient	7 天		
	Dipyridamole			1~2 天	
凝 血 藥 品	Warfarin	Cofarin	INR 1.5~2.0	3 天	
			INR 2.0~3.0	5 天	
			INR >3.0	6-7 天	
	Dabigatran	Pradaxa	Cler ≥ 80		
			低出血風險 1 天	高出血風險 2-3 天	
			Cler 50-79		
			低出血風險 1.5 天	高出血風險 3 天	
			Cler 30-49		
			低出血風險 2-3 天	高出血風險 4-5 天	
	Rivaroxaban	Xarelto	Cler 正常		1 天
			Cler 60-90		1-2 天
			Cler 30-59		2-3 天
			Cler <29		3 天
	Apixaban	Eliquis	Cler >30		1-2 天
Cler <30			2-3 天		
Edoxaban	lixiana	Cler >30		1-2 天	
		Cler <30		2-3 天	

病歷號: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

開刀日期: \_\_\_\_\_

停藥日期: \_\_\_\_\_

藥物名稱: \_\_\_\_\_

停藥日數: \_\_\_\_\_

高出血風險手術建議於術後 48-72 小時再恢復用藥。  
低出血風險手術建議於術後 24 小時內可恢復用藥。

參考文獻:

(Europace.(2021),00,1-65; Taipei City Medical Journal.(2018),15(2):028-038;NEngl J Med.(2013),368:2113-24 );藥品仿單

病患/家屬簽名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

醫師簽名: \_\_\_\_\_

阮綜合醫院 關心您!

【心臟內科、專師部製作】

2021/08/05 制訂、2022/04/14 修訂、2023/05/24 修訂