



抗反轉錄病毒治療藥物衛教

藥名	常見副作用	用藥須知
<p>Triumeq (DTG/3TC/ABC) 三恩美</p> 	失眠、憂鬱、頭暈、頭痛、噁心、腹瀉、疲倦。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可空腹或隨餐併服。 2. 可剝半、磨粉、管灌。(破壞劑型後須立刻使用) 3. 併用含多價陽離子藥物或補充品可能影響藥物吸收。 4. 服用本藥時不可餵哺母乳。 5. 孕婦婦女應告知風險。 <p>★忘了吃，12小時內補★</p>
<p>Biktarvy(BIC/FTC/TAF) 吉他韋</p> 	腹瀉、噁心、頭痛、疲倦、暈眩、失眠。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可空腹或隨餐併服。 2. 不可剝半、磨粉、管灌。 3. 可同時治療 B 型肝炎。 4. 併用含多價陽離子藥物或補充品可能影響藥物吸收。 5. 服用本藥時不可餵哺母乳。 <p>★忘了吃，12小時內補★</p>
<p>Odefsey(RPV/FTC/TAF) 安以斯</p> 	噁心、暈眩、異常做夢、頭痛、腹瀉、失眠。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需隨餐併服。 2. 不可剝半、磨粉、管灌。 3. 可同時治療 B 型肝炎。 4. 併用制酸劑可能影響藥物吸收。 5. 服用本藥時不可餵哺母乳。 <p>★忘了吃，12小時內補★</p>

藥名	常見副作用	用藥須知
<p>Dovato(DTG/3TC) 洛瓦梭</p> 	<p>頭痛、噁心、腹瀉、失眠、疲倦、頭暈。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可空腹或隨餐併服。 2. 可剝半、磨粉、管灌。 3. 併用含多價陽離子藥物或補充品可能影響藥物吸收。 4. 服用本藥時不可餵哺母乳。 5. 孕婦婦女應告知風險。 <p>★忘了吃，12小時內補★</p>
<p>Juluca(DTG/RPV) 滋若愷</p> 	<p>腹瀉、頭痛、疲倦、腹痛、噁心、嘔吐。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需隨餐併服。 2. 不可剝半、磨粉、管灌。 3. 併用含多價陽離子藥物或補充品可能影響藥物吸收。 4. 服用本藥時不可餵哺母乳。 5. 孕婦婦女應告知風險。 <p>★忘了吃，12小時內補★</p>
<p>Symtuza(DRV/Cobi/FTC/TAF) 信澤力</p> 	<p>腹瀉、皮疹、噁心、疲倦、頭痛、腹部不適、脹氣。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需隨餐併服。 2. 可剝半、磨粉、管灌。 3. 可同時治療B型肝炎。 4. 服用本藥時不可餵哺母乳。 <p>★忘了吃，12小時內補★</p>

藥名	常見副作用	用藥須知
<p>Delstrigo(DOR/3TC/TDF) 達滋克</p> 	<p>暈眩、噁心、頭痛、失眠、腹瀉、皮疹。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可空腹或隨餐併服。 2. 不可剝半、磨粉、管灌、分包。 3. 服用本藥時不可餵哺母乳。 4. 可同時治療 B 型肝炎。
<p>Truvada(TDF/FTC) 舒發泰</p>  <div data-bbox="145 1272 686 1601" style="background-color: #FFD700; padding: 10px; border-radius: 15px;"> <p>服藥方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每日服用(daily taken) 2. 依需求使用(on-demand)(女性不適用)  <p>性行為前 2-24 小時吃 2 顆</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">發生性行為</p> <p>開始服藥後 24 小時再吃 1 顆</p> <p>間隔 24 小時吃最後 1 顆</p> </div>	<p>疲倦、噁心、腹瀉、頭暈、嘔吐、腹痛、腎功能損傷。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可空腹或隨餐併服。 2. 不可剝半、磨粉、管灌。 3. 服用本藥時不可餵哺母乳。 <p>★忘了吃，12 小時內補★</p> <p>◎每日服用(daily taken)：每日服用 1 顆 PrEP 藥物，以維持藥物濃度。</p> <p>◎依需求時使用 (on-demand) (性行為 2-24 小時前服用 2 顆藥物，服藥後 24 小時與 48 小時後，再各服用 1 顆藥物)；若性行為為頻繁，建議仍以每日使用為原則。</p>