



# 認識登革熱



阮綜合醫院  
阮綜合醫療社團法人  
YUAN'S GENERAL HOSPITAL

2019/03 製訂、2023/12 修訂

## 一、常見症狀及致病原



埃及斑蚊



白線斑蚊



圖來源:疾管署-一分鐘認識登革熱

## 二、潛伏期：

約為 3 至 8 天(最長可達 14 天)。

## 三、治療方法與照護：

目前沒有特效藥物可治療登革熱，所以感染登革熱的患者，多休息、多喝水、依醫師醫囑適時服用退燒藥(避免阿斯匹林)，並使用蚊帳，避免再被蚊子叮咬，將病毒傳染給他人，通常在感染後兩週左右就可自行痊癒。

## 四、預防方法：

1. 家中應該裝設紗窗。
2. 睡覺時最好掛蚊帳。
3. 把不用的花瓶、容器等倒放。
4. 皮膚裸露處塗抹防蚊液(膏)。
5. 至市場或公園等戶外環境，宜著淡色長袖衣物。

五、如果出現(下圖)任何登革熱的警示徵象，請迅速就醫



圖來源:衛生福利部疾病管制署

參考資料：衛生福利部疾病管制署

製作單位：護理部 9B 護理站

諮詢電話：07-3351121 轉 1417