



傷口引流管照護



阮綜合醫院
阮綜合醫療社團法人
YUAN'S GENERAL HOSPITAL

2022/03 修訂、2023/08 檢視

引流管照護須知

1. 引流管要固定好，避免壓迫、拉扯及扭曲，而影響引流管的通暢，並隨時檢查引流管連接處有無脫落及漏氣。
2. 引流袋勿提高超過引流傷口的高度，須保持低於傷口引流位置之下，以防引流液逆流回體內。
3. 臥床時可引流袋平放於床上或懸掛床欄旁，引流袋應低於傷口位置，且引流袋不可碰觸地面，避免感染。
4. 放置傷口引流管，仍可多翻身及早期下床活動，可促進引流液排出。
5. 一般引流液正常性質為暗紅變淡紅色，量逐日變少。
6. 引流液若超過引流袋的一半時，可由護理人員協助倒出並記錄量及性質。
7. 下床活動時，可使用安全別針將引流袋固定於衣服、繫在腰帶上或夾子固定於衣服上，並留適當的長度，預防翻身或活動時避免拉扯到管子。
8. 下床活動或變換姿位前，須先確認管路是否固定，且緩慢移動，避免拉扯管路。



傷口引流 (7B製圖)



胸腔引流 (7B製圖)

返家後注意事項，下列情形須馬上回診

1. 引流管傷口周圍的變化，如：紅、腫、熱、痛。
2. 發燒或寒顫。
3. 當引流液有異常時：例如顏色改變、量突然變多或味道改變。
4. 傷口周圍皮膚癢，切勿用手抓癢，改以輕拍方式，避免感染。
5. 引流管阻塞或滑脫。
6. 傷口上紗布滲液多，引流量突然減少或無引流量。

參考資料：新編內外科護理學、榮總護理。

製作單位：護理部 7B 護理站

諮詢電話：07-3351121 轉 2777