



止痛貼片使用須知



阮綜合醫院
阮綜合醫療社團法人
YUAN'S GENERAL HOSPITAL

2019/04 制定、2023/09 修訂

一、止痛貼片的用途是什麼？

是一種強效麻醉性止痛劑，由皮下微血管吸收貼片上的藥物，在72小時內能持續釋放成分於全身循環，以控制慢性疼痛和頑固性疼痛。

吩坦尼止痛貼片劑量圖示



圖：阮綜合藥劑科藥品辨識系統

二、使用須知：

1. 使用貼片前欲清潔投與部位的皮膚，用清水潔淨即可。不能使用肥皂、油、乳液或任何其它會刺激皮膚或改變膚質的物質。
2. 貼片應貼於上身軀幹(前胸、後背)或上臂、大腿毛髮較少的部位，避開傷口、發紅或放射線治療部位。
3. 使用貼片前要將貼於部位（最好是無毛髮生長的區域）的毛髮剪除（勿用刮的方式剔除以免皮膚受損）。
4. 貼上皮膚後要以手掌緊壓30秒的時間，以確保貼片及四周完全緊貼。

5. 避免泡熱水澡，或將貼片直接接觸熱源，例如熱水袋、地毯。
6. 如有突發性疼痛時，再加貼片不會立刻止痛，應依醫師指示服用其它需要時服用的止痛藥。

三、相關副作用：

1. 便秘、呼吸減慢、噁心、嘔吐、便秘、意識不清、鎮靜和嗜睡。
以上副作用若情況嚴重請立刻回診。
2. 若有嚴重過敏反應、無法呼吸、肌肉痙攣、持續胸痛及心跳不規則應立即就診。

四、為維護使用者的使用權利，請務必遵循以下事宜：

1. 使用時一定要填寫記錄表（貼上及撕下的日期時間），並簽名。
2. 使用過的貼片請放入原包裝，與登錄表帶至原醫院回收。
3. 依管制藥品管理條例，如果使用短缺需說明(如遺失需說明原因)，否則不得再開立處方。
4. 藥品需放置在攝氏15 ~ 25°C 乾燥處所；如果發生變質或過期請送回原醫療院所，絕對不可以再使用。
5. 貼片絕對不可以分割、切開或以任何方式破壞，因可能會破壞貼片的緩釋劑型。(因藥效屬緩慢型釋放作用)

參考資料：http://intranet/net/pharmacy/upload/Durogesic_D.pdf。

製作單位：護理部 9C 護理站

諮詢電話：07-3351121 轉 1971~1973