

人工血管照護 (Port)

2024/4/15 修訂

什麼是人工血管

人工血管是內植式中央靜脈導管的簡稱，一般稱為人工血管。需經由外科手術植入體內，通常放置在鎖骨下方前胸處，局部麻醉即可；手術時切開約 3~5 公分左右的切口，外觀看起來約十元硬幣大小突起，並不會影響您的一般日常生活、休閒及活動。

裝置人工血管適應症

- ☞ 長期接受化學治療者。
- ☞ 長期輸血、抽血者。
- ☞ 血管硬化及靜脈血管注射不易者。
- ☞ 經口服或肌肉注射止痛劑，漸覺效果不佳，須使用靜脈止痛給藥者。
- ☞ 長時間由靜脈注射點滴者。




圖: <https://reurl.cc/Wx1dRO/>

手術後要注意什麼？

- ◇ 手術後，傷口以紗布覆蓋，隔天醫護人員會檢視您的傷口及換藥。
- ◇ 手術傷口應保持清潔、乾燥，紗布若有滲濕應立即更換，傷口未癒合前應避免碰水。傷口若貼美容膠或防水薄膜，不要刻意撕去，待其自行掉落。
- ◇ 觀察傷口有無紅、腫、熱、痛及肢體腫脹等情形，若有上述症狀應立即告知醫護人員。




圖: <https://reurl.cc/3XYDXX>

人工血管使用期間注意事項

- ◇住院期間每 7 天會更換一次彎針，以防水敷料與皮膚緊密黏貼固定，若敷料不慎脫落，請告知醫護人員更換，避免彎針滑脫。
- ◇注射部位必須保持清潔、乾燥，若不小心弄濕請告知醫護人員更換敷料。
- ◇藥物滴注時，人工血管處應避免碰撞、拉扯導管，不可躺向該側及長時間高舉過肩，如：將手枕於頭下，過度伸展手臂，容易造成注射彎針移位引發藥物外滲的危險。

返家日常照護注意事項

- ◇每天需觀察人工血管座周圍的皮膚，若有出現紅、腫、熱、痛、分泌物及發燒等症狀，應立即返回醫院求診。
- ◇一般日常活動不受影響，為了避免導管移位，裝置人工血管同側手臂勿過度活動，如：360 度旋轉、激烈的擴胸運動、游泳、提重物、打高爾夫球，且須避免碰撞人工血管。
- ◇睡覺時請勿側向人工血管方向，可能會因為壓迫人工血管造成阻塞。
- ◇定期回門診檢查，若長期輸注時，至少每個月返院以抗凝血劑常規沖洗人工血管注射座，以避免人工血管阻塞。